

Usted ha sido programado para un procedimiento cuyo objetivo es introducir uno o varios medicamentos a través de una sonda vesical a la vejiga. Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones, necesarias antes y después de la realización del mismo:

#### **ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

Se recomienda no ingerir muchos líquidos para evitar en lo posible el deseo de eliminar.

#### **EL DIA DEL PROCEDIMIENTO**

- Estando en el servicio, el personal del servicio le indicará en que momento puede eliminar.
- La administración del medicamento dura unos minutos y no es necesario estar en ayunas.
- Luego de la administración del medicamento debe permanecer 2 horas en la camilla, cambiando de posición cada 15 minutos, por 2 horas (de lado izquierdo, de lado derecho, boca arriba y boca abajo). La idea es que el medicamento toque todas las paredes de la vejiga con el fin de obtener mejores resultados

#### **DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:**

- Debe procurar por no orinar en las siguientes 2 horas, así el medicamento actuará más en su vejiga.
- Pasadas las 2 horas debe tomar abundantes líquidos para eliminar el medicamento prontamente.
- El inodoro se debe lavar de ser posible, con límpido después de haberse utilizado y al menos durante los 2 días siguientes a la administración.

#### **POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:**

- Molestia al orinar.(ardor, irritación, picazón)
- Síntomas similares a una gripe.
- Molestias en el pene o en genitales (ardor, irritación, picazón).
- Temperatura hasta 38° C.
- Cualquier otro síntoma extraño deberá ser consultado por urgencias.

**En caso de dudas puede comunicarse al teléfono 444 15 55 opción 2 ext. 9621 (Sede Centro) Opción 1 ext. 5770 (Sede Tesoro) o puede escribirnos al correo electrónico: [oncologia@clinicaelrosario.com](mailto:oncologia@clinicaelrosario.com)**