

**Usuario:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_

- Permanecer en observación según criterio médico.
- Reposo absoluto las primeras 4 horas.
- Luego tener reposo relativo (solo ir al baño, no realizar esfuerzos), las siguientes 24 horas después de la biopsia.
- Controlar la eliminación de orina las primeras 24 horas, evaluando presencia de sangrado.
- El dolor se maneja con analgésicos comunes (acetaminofén) y abstenerse de tomar medicamentos anticoagulantes (Aspirina) los primeros tres días después de la biopsia.
- Retirar cura o apósito del sitio de punción al día siguiente.

**Debe consultar al servicio de urgencias que su entidad de salud le tiene asignado  
Si presenta:**

- Sudoración excesiva, Palidez, Frialdad, Temblor.
- Dolor intenso en la espalda.
- Inicialmente puede observar orina con pintas de sangre, si aumenta el sangrado consultar.
- Fiebre, nauseas, vómito
- Si observa signos de infección a nivel del sitio de punción tales como enrojecimiento, calor, salida de líquido de color amarillo o pus.

**Recomendación:**

- Reclamar resultado de patología.
- Solicitar cita para revisión de estudio a médico tratante una vez tenga resultado de anatomía patológica.

**Recuerde llenar la encuesta entregada en recepción luego de su examen, sus  
sugerencias son importantes para mejorar nuestro servicio**